

主なマラリア予防内服薬の比較

薬品名 (商品名)	メフロキン (メファキン®)	アトバコン・プログアニル (マロン®)	ドキシサイクリン (ビブラマイシン®)
国内での承認	○	○	×
服用方法	1週間 に1回、1錠を内服	1日に1回、1錠を内服	1日に1回、1錠を内服
服用の開始時期	渡航の1~2週間前から	渡航の 1~2日前 から	渡航の 1~2日前 から
服用の終了時期	帰国から4週間後まで	帰国から 1週間後 まで	帰国から4週間後まで
例) 2週間渡航時	8週間 (2+2+4) 服用	23日 (2+14+7) 服用	44日 (2+14+28) 服用
用量の調整	体重45kg未満の場合	体重40kg以下の場合	体重45kg未満の場合
薬価の概要	約800円/1錠	約500円/1錠	約20円 /1錠
主な副反応	消化器症状, 精神神経症状	消化器症状, 精神神経症状	消化器症状, 日光過敏
副反応の発現率*	医療相談11% / 中止4%	医療相談7% / 中止2%	医療相談6% / 中止3%
使用禁忌	精神疾患, 痙れん, 過敏症	腎障害, 過敏症	過敏症
妊婦の適応	なし(要相談)	なし	なし
小児の適応	なし(要相談)	体重40kg以上(要相談)	なし
長期の渡航	◎	△	○
短期の渡航	○	◎	△
備考	タイ国境周辺に薬剤の耐性	2013年2月22日発売	マラリア以外の感染予防

作成日:2012年3月5日(国立国際医療研究センター国立感染症センター)

* Schlägenhuf P, BMJ 2003より引用

詳細については、必ず担当の医師にご確認下さい