

予防接種後のアナフィラキシーへの初期対応フローチャート

アナフィラキシーと迷走神経反射の鑑別

- 皮膚所見
掻痒, 膨疹, 血管浮腫
- 頻脈
- 喘鳴

予防接種者の **異変** に気付く

緊急性 を判断する！

- 【呼吸器症状】**
- 犬吠様咳嗽
 - 呼吸困難
 - 頻呼吸
 - 喘鳴
 - 嚔声
 - チアノーゼ

- 【全身症状・循環器症状】**
- 動悸
 - 冷汗
 - 脱力
 - 脈拍触知微弱・消失
 - 顔面蒼白
 - 意識レベル低下
 - 失禁

主な臨床徴候

- **皮膚症状**
・蕁麻疹, 血管性浮腫
・顔面紅潮
・掻痒感
- **呼吸器症状**
・呼吸困難, 喘鳴
・喉頭浮腫, 嚔声
・鼻炎
- **めまい, 失神**
- **腹部症状**
・嘔気, 下痢, 腹痛
- **頭痛, 胸痛**

なし

あり

症状・バイタルサイン確認

大声で協力要請
※その場を離れない！

皮膚症状のみ
バイタルサイン安定

血圧低下
頻脈
SpO2低下

発見者

近くのスタッフ

外来医師に報告

医師による診察・病態評価
抗ヒスタミン薬(ポララミン®) 内服/静注

- 【発見者】**
- 呼吸、脈拍の確認
 - 心肺停止時は心肺蘇生
 - その場で安静を保つ体位
・血圧低下時は下肢拳上
・嘔吐時は側臥位
・呼吸困難時は座位で後ろに寄りかからせる

- 【連絡】**
- 近くの医師に連絡
 - ドクターハート
 - 小児の場合, 小児科に
応援要請(※1)
 - 他の受診者の対応

- 【準備】**
- 血圧計、パルスオキシメーター
 - ストレッチャー
 - 救急カート
 - モニター
 - AED(※2)

経過観察

医師による診察・病態評価・鑑別診断

改善
外来フォローアップ

増悪
遷延
入院で経過観察

治療へ

※1 小児科連絡先
・平日: 小児科外来 or ○○Dr
・夜間・休日: 小児科当直

※2 AEDの設置場所は別紙参照

予防接種後のアナフィラキシーの初期治療フローチャート

