

予防接種後のアナフィラキシーへの初期対応フローチャート

2018. 3. 29 改訂

予防接種者の **異変** に気付く

緊急性 を判断する！

【呼吸器症状】

- 犬吠様咳嗽
- 呼吸困難
- 頻呼吸
- 喘鳴
- 嘔声
- チアノーゼ

【全身症状・循環器症状】

- 動悸
- 冷汗
- 脱力
- 脈拍触知微弱・消失
- 顔面蒼白
- 意識レベル低下
- 失禁

主な臨床徴候

- **皮膚症状**
 - ・蕁麻疹, 血管性浮腫
 - ・顔面紅潮
 - ・掻痒感
- **呼吸器症状**
 - ・呼吸困難, 喘鳴
 - ・喉頭浮腫, 嘔声
 - ・鼻炎
- **めまい, 失神**
- **腹部症状**
 - ・嘔気, 下痢, 腹痛
- **頭痛, 胸痛**

アナフィラキシーと迷走神経反射の鑑別

- 皮膚所見
掻痒, 膨疹, 血管浮腫
- 頻脈
- 喘鳴

なし

あり

症状・バイタルサイン確認

アラームを鳴らす(医師を呼ぶ)

※発見者はその場を離れない！
すぐに人が集まらない場合には大声で人を呼ぶ

皮膚症状のみ
バイタルサイン安定

血圧低下
頻脈
SpO2低下

初期対応医師・看護師

他のスタッフ

- 医師: リーダを宣言、指示をだす
- 看護師: バイタルサインをモニター
- その場で安静を保つ体位
 - ・血圧低下時は下肢拳上
 - ・嘔吐時は側臥位
 - ・呼吸困難時は座位
- 心肺停止時はドクターハート、心肺蘇生

- 状況を記録
- 外来師長・部門責任医師に連絡
- 他の患者への状況説明
- 小児の場合、小児科に応援要請(※1)
- 移動を要する時、ストレッチャーを持参
- 酸素を要する時、酸素ボンベを持参
(救急外来ストレッチャーに積載)

外来医師に報告

医師による診察・病態評価

モニター、救急カートを用意

モニターを装着し経過観察

増悪

なし

緊急性を判断する

あり

※ 小児科連絡先
・平日: 小児科外来(2524)
・夜間・休日: 小児科当直

改善

遷延

医師の判断でドクターハート(5555)

外来フォローアップ

外来・入院での治療・経過観察検討